

MARIMEX

bazénová chemie

AQUAMAR

CHLOR KOMPLEX

CHLOROVÉ TABLETY VELKÉ

1
REGULACE pH

2
DEZINFKECE

3
ŘASY

4
VLOČKOVÁNÍ

5v1

1,6 kg

Multifunkční přípravek k pravidelnému komplexnímu ošetření vody

Vzhled a složení: Dvojvrstvé modrobílé tablety s tvarovými částicemi s hmotností 200 g pomalu rozpustné ve vodě. Účinnou látkou je symklossen (kyselina trichlorosikyanurová) cca 890 g/kg, indexové číslo: 613-031-00-5.

Působení: Dezinfekční přípravek (typu 2) se používá pro komplexní průběžné ošetřování bazénové vody. Spojuje v jedné dávce 5 účinků potřebných pro správné ošetřování bazénové vody. Přípravek vodu dezinfikuje, likviduje řasy, vločkuje, zjistruje a stabilizuje vápenatou tvrdost. Po ponovení tablety do vody dochází k jejímu postupnému rozpuštění, kdy se uvolňují všechny účinné složky. Pozor! Přípravek nesnížuje vápenatou tvrdost, ale stabilizuje ji, a tak omezuje tvorbu vodního kamene.

Návod k použití a dávkování: Před prvním použitím přípravku upravte hodnotu pH na 6,8–7,2. Pak provedte preventivní ošetření bazénové vody rychlorozprutným chlorovým přípravkem Aquamar Start a stabilizátorem chloru Aquamar Chlor Stabil. Podle teploty vody pak přidávejte každých 5–8 dní 1 až 2 tablety tohoto přípravku na 30 m³ vody (do teploty 25 °C 1 tabletu a nad 25 °C 2 tablety). Obecně platí, že pro dosažení krystalové čistoty a trvalo hygienicky nezávadné vody by měla být hodnota pH udržována v rozsahu 6,8–7,2 a obsah volného chloru udržován v rozmezí 0,3–0,6 mg/l, při teplotách vody nad 28 °C udržuje koncentraci volného chloru mezi 0,5–0,8 mg/l. Klesne-li obsah volného chloru pod hodnotu 0,3 mg/l, je třeba dodat chlor, pokud je výšší než 1,0 mg/l, bazén nepoužívejte, omezte dodávku chloru a vyčkejte, až tato hodnota klesne do výše uvedeného hodnoty. Hodnotu obsahu chloru průběžně nejméně 2x týdně kontrolujte vhodnými testery.

Způsob aplikace: Plovákem: do dávkovače plováku vložte potřebné množství tablet. Nechte plovák, aby se volně pohyboval po hladině bazénu, kde je větší pohyb vody. Dávkovačem vestavěným do cirkulačního potrubí: do dávkovače dejte potřebné množství tablet. Regulační ventily dávkovače nastavte tak, aby byla přibližně dodržována hodnota obsahu volného chloru. NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY DO BAZÉNU! NIKDY NEDÁVEJTE TABLETY DO SBERÁCE!

NEBEZPEČÍ: Uvolňuje toxicí plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Může způsobit požár; oxidant. Zdraví škodliv při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoké toxicí pro vodní organismy, s dlouhodobým účinkem. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chráněte před teplom, horúcí povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů. Zamrzte v dechování prachu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Skládajte uzamčené.

Pokyny pro první pomoc: *Při vdechnutí:* Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Volejte lékaře. *Při styku s kůží:* Neprodleně svlékněte znečištěný oděv a omýte kůžu vodou a mydlem. Pokud podráždění pleti výrazně, vyhledejte lékaře. *Při zasazení očí:* Ihned začněte vyláčovat oči s otvorenými víčky a vymutými kontaktními čočkami pod tekoucí vodou nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařské ošetření. *Při požití:* Okamžitě vyláčovat ústa a dejte vypít 2–5 dl vody (ne více, aby nemohlo dojít ke zvracení). NEVYVOLÁVATE ZVRACENÍ! Zajistěte co nejrychlejší lékařské ošetření. Okamžitě volejte lékaře nebo TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel. TIS 224 919 293 nebo 224 915 402).

Skladování: Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu v chladu a suchu při teplotách do 50 °C na dobré větraném místě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, mimo dosah hořlavých, kyselých a oxidujících látok nebo rozpouštěadel. Chraňte před sluncem.

Nepravidelné vedení účinky: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Nedotýkejte se přípravku mokrýma rukama. Výrobce neruší za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Obsah balení: 8 kusů 200 gramových tablet

Doba použitelnosti: Nejméně 3 roky od datu výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Likvidace: Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdejte ve sběrné nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vycistěte několikrát výplachem vody a po vycistění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Datum výroby: Uveden na obalu.
Posouzeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA.

Obsah: 1,6 kg

11301209

2363.011217.03

DistribUTOR:
Marimex CZ s.r.o., Libušská 221/264, 142 00 Praha 4
Tel.: +420 261 222 111 • Email: info@marimex.cz
Největší internetový obchod s bazénem www.marimex.cz

Multifunkčný prípravok k pravidelnému komplexnému ošetrovaniu vody

Vzhled a složenie: Dvojvrstvé modrobiele tablety s tvarovými časťami s hmotnosťou 200 g pomaly rozpustné vo vode. Účinnou látkou je symklossen (kyselina trichlorosikyanurová) cca 890 g/kg, indexové číslo: 613-031-00-5.

Pôsobenie: Dezinfekčný prípravok (typu 2) sa používa na komplexné priebežné ošetrovanie bazénovej vody. Spája v jednej dávke 5 účinkov potrebných pre správne ošetrovanie bazénovej vody. Prípravok vodu dezinfikuje, likviduje řasy, vločkuje, zjistruje a stabilizuje väpenatú tvrdosť. Po ponorení tablety do vody dochádza k jejmu postupnému rozpuštieniu, kedy sa uvoľňujú všetky účinné složky. Pozor! Prípravok neznižuje väpenatú tvrdosť, ale stabilizuje ju, a tak obmedzuje tvorbu vodného kamene.

Návod na použitie a dávkovanie: Pred prvým použitím prípravku upravte hodnotu pH na 6,8–7,2. Potom spravte ošetrovanie bazénovej vody rýchlorozprutným chlorovým prípravkom Aquamar Start a stabilizátorom chloru Aquamar Chlor Stabil. Podľa teploty vody potom pridávajte každých 5–8 dní 1 až 2 tablety tohoto prípravku na 30 m³ vody (do teploty 25 °C 1 tabletu a nad 25 °C 2 tablety). Všeobecne platí, že na dosiahnutie kráľovského čistoty a trvalo hygienicky nezávadnej vody by mala byť hodnota pH udržiavaná v rozsahu 6,8–7,2 a obsah volného chloru udržiavaný v rozmedzí 0,3–0,6 mg/l, pri teplotách vody nad 28 °C udržuje koncentráciu volného chloru medzi 0,5–0,8 mg/l. Ak

klesne obsah volného chloru pod hodnotu 0,3 mg/l, je potreba dodat chlor, pokiaľ je výšší ako 1,0 mg/l, bazén nepoužívať, obmedzte dodávku chloru a výčitejte, až tato hodnota klesne do výšky uvedeného rozmeđia. Hodnota obsahu chloru priebežne najmenej 2x týždenne kontrolujte vhodnými testmi.

Sposob aplikácie: Plavákom: do dávkovača plaváku vložte potrebné množstvo tablet. Nechte plavák, aby sa volne pohyboval po hladine bazénu, kde je větší pohyb vody. Dávkovačem vestavěným do cirkulačního potrubí: do dávkovače dejte potřebné množství tablet. Regulační ventily dávkovače nastavte tak, aby byla přibližně dodržována hodnota obsahu volného chloru. NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY DO BAZÉNU! NIKDY NEDÁVEJTE TABLETY DO SBERÁCE!

NEBEZPEČNSTVO. Pri kontakte s kyselinami sa uvoľnia toxicí plyny (chlor). Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami.

Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlor). Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Veľmi toxicí pre vodné organizmy, s dlhodobým účinkom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosah detí. Uchovávajte mimo odevov tepla, horúcich povrchov, iskoří, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčte. Uchovávajte mimo odevov a iných hořlavých materiálov. Zabráňte vydychovaniu prachu. Zabráňte uvolneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. Uchovávajte uzamknuté.

Pokyny pre prvú pomoc: *Po vdechnutí:* Presuňte postiženého na čerstvý vzduch. Volajte lekára. *Po styku s kožou:* Po vdechnutí vyzlečte znečistený oči a umyte kožu vodou a mydlem. Pokiaľ podráždzenie pretrváva, vyhľadajte lekára. *Po zasazení očí:* Vyhľadajte lekárske ošetrenie. *Po požití:* Okamžitě vyláčovat ústa a dejte vypít 2–5 dl vody (nie viac, aby nemohlo dojít ke zvraceniu). NEVYVOLÁVATE ZVRACANIE! Zajistite co nejrychlejší lekárske ošetrenie. Okamžitě volejte lekára alebo NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. (tel. NTIC 02 5477 4166).

Skladovanie: Prípravok skladujte v pôvodnom uzavretom obale v chalte a suchu pri teplotach do 50 °C na dobré vetrane mieste, oddelenie od potravín, nápojov a krmiv, mimo dosah hořlavých, kyselých a oxidujúcich látok alebo rozpúšťadiel. Chraňte pred sluncem.

Nepravidelné vedenie účinky: Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlor). Nedotýkajte sa prípravku mokrými rukami. Výrobca neruší za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

Obsah balenia: 8 kusov 200 gramových tabliet

Doba použitelnosti: Najmenej 3 roky od datumu výroby pri dodržaní skladovacích podmienok.

Likvidácia: Nepoužitý výrobok alebo prázdný obal so zbytkami odvzdajte v zberne nebezpečného odpadu. Znečistený obal po dôkladnom vyprázdnení vycistite niekolkorát výplachom vody a po vycistení je možné ho odložiť do nádob na zber komunálneho odpadu.

Datum výroby: Uvedený na obale.
Posouzeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA.
Registračné číslo výrobku bio/658/D/13/CCHL

Distribútor pre SR:
MARIMEX SK s.r.o., Rožňavská 3029/17, 831 04 Bratislava
Tel.: 02/330 04 194 • Email: info@marimex.sk
Najväčší internetový obchod s bazénmi www.marimex.sk

